

**ADRIANA C. (Ayuno)**

Femenina de 40 años, originaria de Abasolo Gto, Ama de casa, casada, católica

Antecedentes Heredo-familiares de cáncer uterino, cabeza y cuello, además de hijo con cáncer de recto.

Antecedentes personales patológicos de enfermedad ácido-péptica en autocontrol con omeprazol.

Tumoración de mama izquierda de 6 x 5.5 cm con retracción de piel, indurada, irregular, con adenopatía axilar ipsilateral móvil menor de 1 cm clasificada como BIRADS 5 mediante mastografía.

Biopsia: Carcinoma ductal infiltrante no específico Grado 2 con carcinoma in situ clasificada como T4b N1 M0 (EC IIIB), sin datos de metástasis mediante TAC y gammagrafía

Actualmente en tratamiento mediante Quimioterapia Neoadyuvante con esquema secuencial de antraciclina/alquilante + taxano + Factor estimulante de colonias (8 ciclos)

Se Inicia intervención dietética (tipo ayuno) antes de inicio de 1er ciclo

ELVIA CECILIA N. (Dieta control)

Femenina de 39 años, originaria de León Gto, Ama de casa, casada.

Sin antecedentes heredo-familiares de importancia.

Antecedentes personales patológicos de Síndrome de Cowden y Lhermitte, bocio multinodular (8cm)

Antecedentes Quirúrgicos por lesiones cerebelosas secundarias a síndromes mencionados en 2002 y 2005

Tumoración en mama izquierda con lesión de 6.5 x 6 cm, dolorosa, sólida con adenopatía axilar ipsilateral móvil menor de 1 cm. Biopsia clasificada como T3, N1, M0 (EC IIIA), sin datos de metástasis mediante TAC, aún sin gammagrama óseo

IHQ: RE 100%. RP 100%. HER2 Negativo. Ki 67 4%

Actualmente en tratamiento mediante Quimioterapia Neoadyuvante con esquema secuencial de antraciclina/alquilante + taxano + Factor estimulante de colonias (8 ciclos)

Se Inicia intervención dietética (dieta control) antes de inicio de 1er ciclo

COMPARACIÓN DE TOXICIDAD CICLO 1 AYUNO - CONTROL



COMPARACIÓN DE TOXICIDAD CICLO 2 AYUNO vs CONTROL

